


Richtlijn acute wondzorg

Acute wonden: reiniging, ontsmetting en wondbedekking

Reiniging

Wondsoort

Wondmateriaal




Voorlichting aan de patiënt met een primair gesloten wond

Wondverzorging	Voorlichting
Het onbedekt laten van een primair gesloten wond	Adviseer de patiënt geen wondbedekker te gebruiken, of alleen in de volgende gevallen: <ul style="list-style-type: none"> om exsudaat of transudaat op te vangen als een patiënt hieraan de voorkeur geeft, ook al is deze op de hoogte dat bedekken het infectierisico niet vermindert en het verwijderen van verbandmateriaal extra pijn kan veroorzaken
Dagelijks leven	Voorlichting
Nat worden van de wond	Bij een primair gesloten wond is kort douchen toegestaan binnen 12 uur (in de eerste lijn) en na 24 uur (in de tweede lijn)
Mobilisatie	De operateur stelt per patiënt een mobilisatieadvies op, gebaseerd op: persoonlijke voorkeur van de patiënt, locatie van de wond, verwachte genezigstendens en het type ingreep
Blootstelling aan UV-licht	Bescherm de wond minimaal drie maanden tegen UV-licht

Voorbeelden voor verwijzing

Verwijzen naar hoofdbehandelaar/ specialist 2 ^e lijn	Verwijzen naar 1e lijn
<ul style="list-style-type: none"> Onzekere patiënt Onzekere zorgverlener Toename pijn / onverklaarbare pijn Langere genezigstendens dan verwacht 	
Primair gesloten wonden	
<ul style="list-style-type: none"> Platzbauch Wonddehiscentie Blootliggende prothese of osteosynthesemateriaal Tekenen van cellulitis/erysipelas 	<ul style="list-style-type: none"> hechtingen verwijderen
Secundair genezende wonden	
<ul style="list-style-type: none"> Stagneren genezigstendens na 4 weken therapie Overige wonden: <ul style="list-style-type: none"> Pees-, bot-, zenuw- of spierletsel Bijtwonden met tekenen van infectie aan de volaire zijde van de hand 	Overige wonden: Indien de wond twee weken een genezigstendens vertoont
Geïnfecteerde wonden	
<ul style="list-style-type: none"> Diabetische patiënt → Diabetische voetenpoli 	

Pijnbestrijding



Deze poster behoort bij het artikel *Zorg voor de acute wond*, van Hester Vermeulen, Fleur E. Brölmann en Dirk T. Ubbink, in *Nursing* juni 2013.

De schema's op deze poster komen uit de *Evidence-based richtlijn voor de behandeling van wonden met een acute etiologie in de ketenzorg* van de Afdeling Kwaliteit & Procesinnovatie, Academisch Medisch Centrum (AMC) en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, november 2013. De richtlijn is te vinden op www.heelkunde.nl.