



Korte beschrijving goedgekeurde subsidieaanvragen Less is More

- 1. NVZA – anti-Xa spiegels** Stoppen met het bepalen van anti-Xa spiegels bij het gebruik van laag-moleculairgewicht heparines (LMWH) bij volwassen patiënten met verminderde nierfunctie.
- 2. NVALT – pemetrEXIT**
Het stoppen van pemetrexed als onderhoudsbehandeling bij immunochemotherapie bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).
- 3. NIV – Bepaal M-proteïne alleen op indicatie in osteoporosescreening**
Het stoppen van overdiagnostiek van M-proteïne door niet standaard bepalen in de screening van osteoporose, alleen op indicatie.
- 4. NVK – verkorten observatieduur neonaten met meconiumhoudend vruchtwater**
De standaard observatieduur van minimaal 8 uur, voor neonaten die geboren worden met meconiumhoudend vruchtwater, maar met een goede start en in afwezigheid van risicofactoren, verkorten tot 4 uur.
- 5. NVU – Stoppen follow-up blaascarcinoom (REDCYS)**
Follow up middels cystoscopieën van patiënten met een laag risico niet-invasief blaascarcinoom stoppen na 1 jaar i.p.v. na 5 jaar.
- 6. NVDV – Verminderen controles bij patiënten met systemische medicatie voor inflammatoire huidaandoeningen.**
Het verminderen van onnodige screening en monitoring van patiënten met inflammatoire dermatosen die systemische medicatie gebruiken (hidradenitis, psoriasis en eczeem).
- 7. NVOG – Verlagen frequentie follow-up na ovariumcarcinoom**
Het verlagen van de frequentie van de follow-up van patiënten na curatief behandeld ovariumcarcinoom, van 15 controles naar 6 in een periode van 5 jaar. Daarnaast een deel van deze follow-up consulten laten verrichten door een verpleegkundig specialist.
- 8. NWVC – Verricht geen standaard echocardiogram bij patiënten met een CVA/TIA**
Het stoppen met het standaard verrichten van een echocardiogram voor analyse van een mogelijke cardiale emboliebron na een CVA/TIA.
- 9. NWVC – Follow up bij patiënten met een biologische hartklepprothese**
Het stoppen van het standaard verrichten van een follow-up echocardiografie in de eerste vijf jaar van patiënten met een biologische hartklepprothese.



10. NVMDL – Surveillance IBD

Het stoppen van de surveillance bij patiënten met inflammatory bowel disease (IBD) met een laag-mild risico op colorectaal carcinoom.

11. NVMDL – Alvleeskliercysten (PRECIES)

Het stoppen met levenslange follow-up van patiënten met een laag risico pancreascyste.

12. NVN – Niet standaard klinische opname na licht herseninfarct

Het stoppen met het standaard opnemen ter observatie van alle patiënten met een licht herseninfarct.

13. NVvH – Stoppen standaard opereren van appendicitis

Stoppen met het standaard verrichten van een appendectomie (verwijderen blindedarm) bij een simpele acute blindedarmontsteking, maar behandelen met orale antibiotica.